

# EL PÍRCING I EL TATUATGE

# 10.2

## **Avui en dia fer-se un tatuatge o un pírcing està de moda.**

Però has de saber que perforar la pell té el risc de provocar algunes malalties, concretament l'hepatitis pels virus B i C, i la sida, que es transmeten per la sang.

## **Si et vols fer un pírcing, no oblidis que:**

Tot el material que es faci servir ha de ser estèril. És millor fer-los amb una agulla estèril i no pas amb una pistola de pírcing, per tal de reduir el risc de contagiar-se del virus de l'hepatitis B i C, o de la sida.

La peça que et posis procura que sigui d'acer inoxidable d'ús quirúrgic, or de 14-18 quirats o titani, ja que així reduiràs el risc d'infecció i al·lèrgies.

Tots els estris que es facin servir, com els adaptadors i altres elements necessaris, han d'estar esterilitzats i caldrà que es guardin en bosses o recipients estèrils fins que s'utilitzin.

La persona que et faci el pírcing ho haurà de fer amb guants de tipus quirúrgic que seran nous cada vegada, i no haurà de tocar res més que el que hagi d'emprar per fer-te'l.

La pell s'ha de netejar i desinfectar abans de perforar. Has de saber quins mètodes de desinfecció has de seguir i quants cops al dia ho has de fer fins que cicatritzi totalment. Si malgrat tot la ferida s'infecta, has d'anar al metge amb rapidesa per evitar complicacions.

## **Si t'has de fer un tatuatge (*tattoo*), recorda que:**

El tatuador s'ha de rentar bé les mans i col·locar-se, cada vegada que tatuï, guants de tipus quirúrgic, que sempre ha de dur posats.

El material que s'usa (agulles i tintes) ha de ser d'un sol ús.

### **Per a més informació:**

- Decret 28/2001, de 23 de gener, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables als establiments de tatuatge i/o pírcing
- Guia higienicosanitària per a professionals del tatuatge, pírcing i micropigmentació

# Piercings: possibles complicacions

## Zona Riscos

---

 <b>ALA NASAL</b>	Infecció, endocarditis (infecció cardíaca), granulomes
<b>LLENGUA</b>	Obstrucció de les vies respiratòries i problemes dentals, perill d'empassar-se el pírcing i problemes vasculars
<b>CELLA</b>	Inflamació, infecció i paràlisi de la parpella
 <b>ORELLA (CARTÍLAG)</b>	Alt perill d'infecció (secrecions purulentes), inflamacions i necrosi
<b>LLAVI SUPERIOR</b>  <b>LLAVI INFERIOR</b>	Abrasió de l'esmalt dental, fractura de dents, problemes a les genives, risc d'empassar-se el pírcing i necrosi (mort dels teixits)
<b>MELIC</b>	Infecció local i secrecions persistents
 <b>PENIS</b>	Estrenyiment de la uretra i estrangulació del gland
 <b>CLÍTORIS</b>	Necrosi, o mort dels teixits



(DESACONSELLAT  
PER L'ALT RISC)